

1887

Lane Medical Library

1995
ÜBER
ERNIA FUNICULI UMBILICALIS.

Inaugural-Dissertation,
welche
nebst den beigegeführten Thesen
mit Genehmigung der
hölblischen medicinischen Fakultät der Universität Breslau
zur

Erlangung der Doctorwürde
in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe

Mittwoch, den 19. Januar 1887,

Mittags 12 Uhr

in der Aula Leopoldina

öffentlich verteidigen wird

GEORG BUSCHAN

aus Frankfurt a/O.

gegen die Herren Opponenten

Dr. med. ROBERT ASCH, Assistenzarzt an der Frauenklinik zu Breslau

l. med. FRITZ WEINHOLD, Assistenzarzt an der Frauenklinik zu Breslau.

BRESLAU
BUCHDRUCKEREI LINDNER

1887.

REFERENT:

HERR MEDICINALRAT PROF. DR. FRITSCH.

HERRN MEDICINALRAT

PROFESSOR DR. FRITSCH

DIRECTOR DER KÖNIGLICHEN FRAUENKLINIK ZU Breslau

IN HOCHACHTUNG UND VEREHRUNG

SOWIE

SEINEM TEUREN OHEIM

HERRN SANITÄTSRAT DR. GALLUS

IN SOMMERFELD

IN DANKBARKEIT UND LIEBE

GEWIDMET

VOM VERFASSEN.

Unter einem gewöhnlichen Nabelbruch versteht man eine Hervorwölbung der Bauchdecken durch Austritt der Eingeweide aus der Bauchhöhle, entweder sogleich nach der Geburt oder zu späteren Leben. Dieses Hervortreten ist die Folge einer verminderten Resistenz der Bauchwandungen und entsteht immer erst *post partum*, und zwar meistens durch mechanische Einflüsse, wie durch Hustenbewegungen, Schreien, Stösse, Fallen oder sonstige Erschütterungen der Intestina. Hierbei dringt der Darm durch die Muskelfasern heraus und schiebt das Bauchfell vor sich her.

Streng von diesem erworbenen Nabelbruche ist der angeborene zu trennen, oder, besser gesagt, der Nabelschnurbruch (*hernia umbilicalis congenita* s. *hernia funiculi umbilicalis*, *Exomphalus congenitus*, *Omphalocele congenita*). Bei diesem angeborenen Bruche liegen die Eingeweide in der Nabelschnur, und die anrenzende Bauchwand ist mehr oder weniger defekt. Dieser Zustand beruht auf der Fortdauer einer foetalen Entwicklungsstufe der ersten Lebensmonate und gehört daher nur uneigentlich zu den Brüchen; er ist vielmehr eine Missbildung und zwar einer Entwicklung nach eine Hemmungsbildung, der Form nach eine Spaltbildung. Allein da sich in der Nabelschnur oft genug solche Organe finden, welche sich, wie Magen oder Milz etc., während der normalen Entwicklung nicht in ihr lagern, so kann diese Missbildung nicht allein als Hemmungsbildung betrachtet werden. Es muss ausserdem zu der einmal vorhandenen Hemmungsbildung noch ein zweiter Faktor, ein Vorfall, hinzu-

gekommen sein. In diesem Sinne wäre die Bezeichnung Bruch zwar gerechtfertigt: als eine Vorlagerung der Eingeweide in Folge verminderter Retraction derselben.

Der Nabelschnurbruch ist eine im ganzen sehr seltene Erscheinung. Nach KRÄMER (p. 218) wurde unter 2500 Geburten, welche man an der Göttinger Gebäranstalt unter Direktor von SIEBOLD registrierte, nicht ein einziger Nabelschnurbruch beobachtet. Auch HEHRHOLD (p. 89) berichtet, dass die Hebeammen über 2000 Geburten gehoben und darunter keinen derartigen Fall gesehen habe. Zu demselben Resultate gelangt auch THUDICHUM (p. 204): nach ihm kommt auf ungefähr 2000 Geburten ein Kind mit Nabelschnurbruch. Nach der neuesten Statistik (1883) giebt LINDFOERS das Verhältniss von 1: 5184 an.

Eine besondere Disposition zum angeborenen Nabelbruch scheint nach meiner Zusammenstellung für das männliche Geschlecht vorhanden zu sein. Denn dasselbe stellt fast das doppelte Contingent, wie das weibliche (43 ♂ 26 ♀).

Wir wollen jetzt auf die anatomischen Eigenschaften der Nabelschnurbrüche übergehen, und zwar zuerst ihre Hülle betrachten. An ihr, der erweiterten Nabelschnurscheide, lassen sich zwei Membranen wahrnehmen, eine äussere Umhüllung und das Bauchfell, über dessen Anwesenheit zwar vielfach Streit erhoben wurde, dessen Vorhandensein aber nicht geläugnet werden kann. Die äussere Bedeckung wird durch den erweiterten Nabelstrang gebildet, welcher einerseits in die Bauchhaut übergeht, andererseits sich in die an irgend einer Stelle des Bruches inserierende Nabelschnurscheide im engeren Sinne fortsetzt. Die innere Auskleidung des Sackes stellt den eigentlichen Bruchsack dar und findet im Peritoneum seine Fortsetzung. Beide Membranen sind durch eine Lage von Bindegewebe miteinander vereinigt, das oft eine gelatinöse Beschaffenheit (AHLFELD Missbildungen p. 202) annehmen und so der WHARTONSchen Sulze ähneln kann. Zuweilen sind noch andere fibröse Zwischenlagerungen vorhanden, wenn auch im wechselnden Grade der Ausbildung, wie die *fascia* und *musculi abdominales* (BUCHHOLZ p. 21. SOEMMERING p. 32. KRAEMER p. 233. THUDICHUM p. 200). In der Mehrzahl der Fälle ist der Bruchsack transparent, sodass man die Bewegung der Gedärme, selbst und ihre Anfüllung mit Meconium deutlich durchsehen

kann. Bei den Fällen, welche nicht letal verliefen, nahm nach KRAEMER (p. 232, ebenso SARPE p. 26) die Transparenz allmählich ab und verschwand gänzlich nach 24 Stunden.

Der Uebergang der Nabelschnurschneide in die Bauchhaut hat bisweilen eine regelmässige Abgrenzung (OTTO Nr. 515), bisweilen aber auch ist diese ungleich zackig (SOEMMERING), d. h. an einzelnen Stellen tritt die normale Haut weiter in die Nabelschnurscheide hinein (KRAEMER p. 220). SARPE führt in seiner Arbeit (p. 26 und 30) für beiderlei Verhalten Beispiele an. Allein AHLFELD (p. 202) hält den scharfabgegrenzten Rand für die Regel, den gezackten als besondere Eigentümlichkeit der Blasenspalte. Ferner behauptet derselbe Forscher (l. c.), dass, wenn man die Frucht von der Aorta aus injiciere, die Färbung nur bis zum Rande der Bruchhülle, nicht auf diese selbst übergehe.

Die Nabelschnur ist meistens sehr kurz. Ihr Sitz an der Geschwulst variiert sehr; bald inseriert sie sich mitten auf der Höhe der Geschwulst (nach THUDICHUM p. 201 am häufigsten), besonders bei irreduciblen Brüchen (DEBOUT), bald häufiger (nach meinen Untersuchungen) an der Peripherie, entweder nach oben, was sehr selten ist, oder öfters an der unteren Hälfte, und zwar entweder in der Mitte, oder nach links häufiger als rechts. In den von mir zusammengestellten 45 Fällen, in denen der Sitz der Nabelschnur vermerkt ist, sass dieselbe

mitten auf dem Tumor 13 Mal,

rechts 1 „

links 2 „

oben 1 „

unten 28 „

davon links unten 5 „

rechts unten 3 „

Summa 45 Mal.

Unter 19 Fällen nach THUDICHUM (p. 202):

mitten 10 Mal

oben 2 „

unten 7 „

Von welchem Werte die Kenntniss des Nabelschnursitzes auf die Lehre von der Entstehung eines derartigen Bruches ist, werde ich am Schlusse auseinandersetzen.*)

Die Nabelgefäße verlaufen bei den Nabelschnurbrüchen in der Wand des Sackes zwischen Amnionscheide und Peritoneum, mit dem sie locker verbunden sind. Sie erleiden oft einige nicht unwichtige Abweichungen von ihrem normalen Verhalten, besonders an Lage und Zahl. Die Vene verläuft theils über den oberen Teil der Geschwulst, theils bald auf der rechten, bald auf der linken Seite, am häufigsten auf letzterer zur Bauchhöhle hin, während die Arterien, von denen häufig genug eine fehlt, wofür die andere verstärkt erscheint (HEHRHOLD p. 60), nach unten liegen und öfters von dem Bruchinhalt mehr nach der einen oder anderen Seite, meist nach links (THUDICHUM p. 200) gedrängt werden. Nach AHLFELD (Missbildg. p. 202) fehlte unter 19 Fällen einmal die Arterie; nach meiner Zusammenstellung ungleich häufiger, nämlich unter 93 Fällen 10 Mal. Das häufige Fehlen einer Nabelarterie schien schon OKEN (p. 70) von Bedeutung zu sein; er erklärt dieses Verhalten für eine Obliteration durch Druck der prolabierten Eingeweide (p. 9). Nicht unerwähnt will ich hierbei lassen, dass auch an der normalen Nabelschnur öfters nur eine Nabelarterie beobachtet wurde, wofür SCARPA (nach THUDICHUM p. 201) mehrere Fälle anführt. Ein besonderer Verlauf der Nabelvene wird zuweilen durch Lageveränderungen der Leber und ihrer Insertionsstelle für die Nabelvene bedingt (NEUGEBAUER.)

Die Bruchwände sind meistens vollständig vorhanden und an der Bruchpforte nur auseinander gedrängt (KRAEMER p. 236), so dass die inneren Ränder der geraden Bauchmuskeln weit von einander abstehen, oberhalb und unterhalb der Bauchgeschwulst aber die *linea alba* besteht und den Nabelring andeutende sich kreuzende Sehnenfasern den Bruchhals umgaben, während die Fascien, wie schon oben gesagt, sich oft über den Bruch fortsetzen.

*) Einen Fall von ganzlichem Fehlen der Nabelschnur, wo die placenta unmittelbar am Bauchsack adhärirte, von OTTO (monstr. descr.) beschrieben hat SARPE in seiner Abhandlung in der Übersetzung ausführlich wiedergegeben.

Einen ähnlichen beobachtete noch THÖRNER (p. 13).

Um den Inhalt des Bruches und seine sonstigen Abnormitäten zu verstehen, ist es nötig vorher eine eingehendere Beschreibung seiner Entstehung zu geben. Wir wissen aus der Entwicklungsgeschichte, dass, wenn der Darmkanal sich anfängt zu bilden, die Bauchdecken nur als dünne schmale Hautstreifen an den Seiten des Primitivstreifens herumwachsen und unmittelbar mit dem Nabelstrang zusammenhängen. Bauch und Nabelbläschen bilden also eine gemeinsame Höhle oder, wie schon OKEN sagt, „der Bauch verlängert sich ununterbrochen, spitzt sich zu und endet unmittelbar in das Nabelbläschen.“ Das Darmrohr, das bis dahin fast geradlinig von vorn nach hinten verlief, beginnt nun am Ende des ersten Monats seine ersten Schlingen zu bilden. „Der mittlere Teil des Rohres, an dem der *ductus omphalo-entericus* befestigt ist, kommt daher oberhalb der Bauchspalte zu liegen. Bei dieser Schlingenbildung legt sich der untere Teil des Darmrohres über den oberen hinweg, so dass der Blinddarm sich am oberen Schenkel der Schlinge bildet. Durch Wachstum des Darmes von seinen beiden Endpunkten verlängert sich das Rohr unverhältnissmäßig schnell. Es muss, um seinen Raum auszunützen, sich noch weiter in Schlingen legen; und so finden wir ungefähr in der achten Woche einen Knäuel von 5—6 Schlingen ausserhalb der Bauchspalte liegen. Während im Anfange der Schlingenbildung die Darmschleife sammt Allantois in dem weiten Raum des Nabelstranges liegt, muss, weil zu gleicher Zeit der Nabelstrang sich verengert, und die ausserhalb der Bauchhöhlenspalte liegenden Darmschlingen sich vermehren, für den dadurch entstehenden Knäuel eine Ausbuchtung am foetalen Ende des Nabelstranges entstehen.“ Sobald sich nun diese Ausbuchtungen des Darmes infolge der Verkürzung des Mesenteriums in die Bauchhöhle vollständig zurückziehen, was gegen die neunte bis zehnte Woche geschieht, vereinigen sich die beiden Bauchplatten von den Seiten her und bilden die *linea alba* mit dem Nabelring. Derselbe birgt normaler Weise dann nur noch die Gefässe der zusammengezogenen Nabelschnur. Gleichzeitig verodet der *ductus omphalo-entericus* und reisst ab. Auf diese Weise verschwindet derselbe allmählig gänzlich, sodass er sich bei der Geburt nur noch als ein minimales Rudiment zeigt, das hin und wieder noch mit dem unbewaffneten Auge wahrgenommen werden kann (cf. HECKER und BUHL I, p. 50).

Es kann nun der Fall eintreten, dass die Retraction der Darmschlingen unterbleibt, oder, was dasselbe sagt, der Dotterstrang bleibt länger, als es normaler Weise geschieht, mit dem Darm im Zusammenhang (Ansicht von AHLFELD.)

Es können dann verschiedene Abnormitäten eintreten, je nachdem „durch den obliterierten Strang ein wirklicher Zug an dem Darne ausgeübt wird oder nicht, ob der *ductus* in seiner ganzen Länge obliteriert ist, oder ob er an dem Ende noch eine trichterförmige Erweiterung zeigt, die mit dem Darmlumen noch communiciert; ob noch ein grösseres Convolut Darmschlingen im Nabel liegt, oder ob der Darm bis auf einzelne Schlingen hinter der Bauchspalte zurückgezogen ist, ob das *colon transversum* oder *descendens* einen Zug ausgeübt habe, der eine Lageveränderung dieser Teile des Darmrohres bewirkt oder nicht; ob endlich schon die Afterbildung begonnen hat, oder wieweit dieselbe vorge-schritten ist.“ Alle diese Eventualitäten geben eine verschiedene Grösse und eine verschiedene Lagerung der vorgefallenen Eingeweide.

Diese Ansicht, wonach die Persistenz des Nabelbläschens an der Entstehung eines Nabelschnurbruches Schuld wäre, ist erst in neuester Zeit, und zwar von dem schon öfters erwähnten Prof. AHLFELD aufgestellt worden. Als Grund, warum das Nabelbläschen nicht abreisst, sieht AHLFELD seine Festigkeit und Dicke an, infolge deren es sich nicht ausdehnen lässt. Der Darm bleibt dann in diesem Falle über die normale Zeit hinaus in dem Nabelbläschen bestehen und bildet später so einen regulären Nabelschnurbruch. Wenn aber die Darmschlinge bereits in die Bauchhöhle zurück getreten ist, dabei der Nabelstrang sich aber noch nicht von ihr getrennt hat, dann treten, wenn auch keine eigentlichen Brüche, so doch verschiedene Anomalien, wie Diver-tikel, Spalten etc. auf.

Dass normaler Weise in den ersten Wochen der embryonalen Entwicklung Darmschlingen in dem Nabelbläschen liegen, war schon den Forschern am Anfange unsers Jahrhunderts bekannt. Früher glaubte man sich die Entstehung von Nabelschnurbrüchen auf mechanischem Wege durch Bersten der Bauchwand infolge von Druck und Gewaltthätigkeit (OKEN p. 47), und wirkliche Bruchbildung erklären zu müssen.

CRUVEILHIER nahm eine fehlerhafte Lage der Frucht, namentlich Zurückbeugen des Körpers als Ursache an, wodurch ein Druck auf die Eingeweide ausgeübt und diese gezwungen werden sollten, durch die vordere Bauchwand durchzutreten. OKEN war der erste, der dieser Ansicht entgegen trat und sie zu widerlegen suchte, indem er nachwies, (p. 7.) „dass nicht durch Herausdringen aus dem Leibe, sondern durch vermindertes Zurückziehen der ursprünglich in der Nabelschnur liegenden Därme“ ein angeborener Nabelbruch entstände. Den Grund, warum die Eingeweide sich nicht zurückziehen könnten, glaubte er in ihrer Erschlaffung gefunden zu haben. Eine Mutter, die durch Fieber und Unpässlichkeit geschwächt wäre, vererbe diese Schlaffheit auch auf ihre Frucht, deren Intestina demnach nicht mehr die Kraft besäßen, sich zurückzuziehen (p. 117.)

Andere Gelehrte haben andere ursächliche Momente dieser Brüche angenommen: eine zu langsame und nicht vollständige Entwicklung der Bauchmuskulatur bei unverhältnismässig starker Massenzunahme der Eingeweide, namentlich der Leber (SCARPA); Adhäsionen des Bauchinhaltes mit der Wandung des Sackes nach vorausgegangener foetaler Peritonitis, weil hierdurch das Zurückschlüpfen der Darmschlingen verhindert wird (SIMPSON); zu starke Drehung der verkürzten (OTTO) oder Zerrung der zweimal um den Hals des Kindes geschlungenen Nabelschnur (MUELLER). Gegen letztere Erklärung wendet THUDICHUM (p. 206) die Thatsache ein, dass zu der Zeit, wo die Eingeweide sich schon wieder in die Bauchhöhle zurückgezogen haben müssten, die Nabelschnur noch nicht die Länge erlangt habe, um sich zweimal um den Hals zu schlingen. Dagegen glaubt derselbe Gelehrte die Ursache für den Vorgang aus der Erschlaffung des Mesogastrium und die Fortsetzung dieses Processes im Mesenterium herleiten zu können.

Es ist einleuchtend, dass die eine Ursache mit der andern combinirt sein kann. Wenn z. B. der Darm stark mit Meconium angefüllt ist, wird dadurch der Zug auf ihn noch erhöht werden. Er wird auf diese Weise selbst durch seine Schwere zum mangelhaften Verschluss der Bauchdecken beitragen. Ausserdem ist hierauf noch von Einfluss die Lage des Embryo, der in der ersten Zeit der Schwangerschaft die Bauch- oder Seitenlage inne hat.

Des Interesses wegen will ich noch kurz die Erklärung der ältesten Anatomen anführen, wonach ein Nabelschnurbruch dann entstehen sollte, wenn sich die Mutter an einem ausgeweideten Tiere (DOERING, LACHMUND) oder an einer Person, die mit einem Nabelbruch behaftet ist (PUR), versehen hätte.

Meiner Ansicht nach lässt sich kein alleiniger Grund für die Entstehung der Nabelschnurbrüche geltend machen, sondern es wird bald der eine, bald der andere aller oben angeführten Gründe vorherrschen. Die Hypothese von AHLFELD, wonach die Ursache in dem Nichtabreissen des Dotterstranges liege, wird durch die Thatsache ins Wanken gebracht, dass einerseits Darmdivertikel, die doch als Überrest des vorhandenen Zusammenhanges zwischen Darm und Nabelbläschen häufig genug vorkommen könnten, nur sehr selten beobachtet wurden, und dass andererseits der Nabelstrang in der unverhältnismässig grössten Anzahl der Fälle nicht mitten auf dem Tumor, sondern an seiner Peripherie inseriert, trotzdem der Zug auf den Embryo senkrecht ausgeübt wird.

Nachdem wir so die Ansichten über die Entstehung der Nabelschnurbrüche entwickelt haben, wollen wir zu ihrer Beschreibung zurückkehren.

Was zunächst die Gestalt und Grösse der vom Bruche erweiterten Nabelschnur anbetrifft, so wechseln diese beiden in verschiedenem Grade. Bald erscheint die Geschwulst kegelförmig, bald kuglig, bald spindelförmig. Die kleinsten Brüche enthalten meistens nur Dünndarmschlingen, zuweilen nur eine Darmdivertikel — eine oft kaum bemerkbare Verdickung der Basis des Nabelstranges. Mittलगrosse bergen in der Mehrzahl der Fälle einen Theil der Leber (*hepatomphalos* deshalb genannt) oder Dünndarmschlingen allein. Die letzteren sind gewöhnlich *jejunum*, seltener Parteen dicker Gedärme. In den grossen und ganz grossen Nabelschnurbrüchen kann der grösste Teil des Darmtractus enthalten sein — ein schlauchartiger, ovaler, an der Vorderwand des Bauches, nicht selten bis zu den Knien des Kindes herabhängender Sack. Derartige hochgradige Formen bilden den Übergang zu den Eventrationen, wo während der Geburt oder schon im Uterus der von zahlreichen Eingeweiden angefüllte Sack zerreisst. KRAEMER (p. 234) fand unter 29 Fällen im Bruchsack:

Gedärme . . .	23 Mal
Leber	22 „
Magen	10 „
Milz	5 „
Herz	2 „

Unter 23 Fällen lag also die Leber nur ein Mal weniger vor als die Gedärme, ja KRAEMER glaubt die Häufigkeit des Vorliegens der Leber noch höher taxieren zu dürfen und zu der Annahme berechtigt zu sein, dass, wo schlechthin nur von Eingeweiden die Rede ist, unter diesen die Leber noch mit eingeschlossen sein mag.

Die Leber kann entweder in schon entwickeltem Zustande in die Bauchhöhle herabgezogen sein oder noch früher, infolge der ersten Anlage als Inhalt des Bruches fungieren. NEUGEBAUER (p. 65) erklärt dieses Verhalten folgendermassen: „Da die Bildung des venösen Blutstromes der Leber nicht von der *vena cava inferior*, sondern von den Stämmen der *ompholo-meseraica* und *vena umbilicalis* ausgeht, ergiebt sich hieraus eine gewisse notwendige Beziehung der Örtlichkeit der Leber zu dem Orte des Zusammentritts dieser beiden Venenstämme, d. h. die Leber wird, da sie sich denselben hier anbildet, auch ihre Lokalität von diesem Orte der Vereinigung dieser Gefässe abhängig machen.“ So kann es sich ereignen, dass, „wenn diese Venen schon tiefer unten im Bauche oder schon innerhalb der Nabelschnurscheide, in welcher, wie wir gesehen, der Darmkanal ursprünglich enthalten ist, in Verbindung treten, die Leber, die sich zunächst als Ausstülpung des *duodenum* bildet, auch herabrückt oder selbst innerhalb der Nabelschnurscheide zur Entstehung kommt.“ Eine dem Nabel ungewöhnlich genäherte Lage des *duodenum* begünstigt die tiefe Lage des Vereinigungspunktes der genannten Venen. Hat aber einmal die Entwicklung der Leber an diesen Orten stattgefunden, dann wird dieselbe die ihr angewiesene Lage notwendig beibehalten, und auch ihr Bänderapparat wird sich demgemäss entwickeln. Zieht sich mittlerweile noch nachträglich der Darm zurück, so wird die Leber allein oder ein Teil derselben den Bruch sack ausfüllen. Die Nabelspalte sucht sich nun zu schliessen, infolgedessen die Leber häufig in 2 Theile abgeschnürt erscheint, wenn sie sich nur zur Hälfte zurückgezogen hatte.

Die Nabelschnurbrüche kommen theils als alleinige Missbildung, bei übrigens wohlgestalteten Kindern vor, theils haben sie

noch mannigfache andere Missbildungen im Gefolge. Nach LINDFOERS sind von 19 Geburten mit Nabelschnurbruch 9 Frühgeburten gewesen, und von diesen 9 wiederum wurden 3 Kinder ohne andere Missbildungen, 6 meistens mit Missbildungen der Genitalien geboren. Die *atresia ani* ist eine nicht unhäufige Complication des Nabelschnurbruchs und dadurch zu erklären, dass der Enddarm, weil er zu straff angezogen wurde, nicht an der Bildung des Afters teil nehmen konnte. Lageveränderungen der Eingeweide ferner, sind beim Nabelschnurbruch nichts ungewöhnliches. Dadurch dass dieselben zum Teil ausserhalb der Bauchhöhle liegen, wird in dieser Platz für andere Organe geschaffen, die nicht normaler Weise dort liegen. Der Magen rückt tiefer herab, ebenso die Milz. Ferner können Herz und Lungen ebenfalls in den Bereich des Nabelschnurbruchs gezogen werden, wenn das Zwerchfell sich gesenkt hat, oder nur teilweise vorhanden ist. Die vorgefallenen Eingeweide, sowie überhaupt die übrigen Teile in der vergrösserten Bauchhöhle fangen deshalb bald an zu wachsen und zu hypertrophieren. Vor allem findet man fast immer die Leber teils partiell gewuchert, teils in toto vergrössert, wobei sie dem Bruchsack sich angepasst und ganz abnorme Form angenommen haben kann. Bei grösseren Nabelbrüchen wird oft auch die Wirbelsäule mit in den Bereich der Missbildung gezogen. AHLFELD lässt dieselbe durch den Zug der Dotterblase sich einknicken und führt dabei an, dass diese Einknickung nicht selten so hochgradig ist, dass der Steiss in die Nähe der Schultern zu liegen kommt. Zu dieser Kyphose der Wirbelsäule gesellt sich oft noch eine Skoliose hinzu. Das Mesenterium wird ferner, wie leicht einzusehen, eine grössere Länge als im normalen Zustande erhalten. Schliesslich ist noch zu erwähnen, dass häufig genug zu der Bauchspaltenbildung noch andere Hemmungsbildungen des Verschlusses der beiden Körperhälften hinzugetreten, wie *spina bifida*, *labium leporinum*, *uterus* und *vagina duplex*, wie überhaupt mangelhafte Entwicklung der Genitalien, Offenbleiben des *septum ventriculorum cordis*, *Hemicephalie* u. a. m.

Es erübrigt sich zum Schluss noch die verschiedenen Arten des Heilverfahrens bei Nabelschnurbrüchen zu berücksichtigen. Hin und wieder sind zwar Spontanheilungen (PANAROLL, GOGRAND, DEBOUT), selbst nach Absterben der Haut (MARGARITEAU) beobachtet worden; doch die Mehrzahl der alten Ärzte, unter ihnen

bedeutende Autoritäten, wie MALGAIGNE, RUYSCH, ALBINUS, HAGER, SOEMMERING u. A., erklärten das Leiden einfach für unheilbar und legten bei vorkommenden Fällen die Hände ruhig in den Schooss, indem sie dem alten PARÉ folgten, der, als er zu einem solchen Kinde gerufen wurde, nur äusserte: *qu'il mourrait bien sans lui*. (KRAEMER p. 237). Allmählich aber wurde man eines Besseren belehrt und indem man mit dieser durch Tradition hergebrachten Ansicht brach, ging man später zu eigenmächtigem Handeln über. Hierbei suchte man zuerst die Natur zu unterstützen dadurch, dass man einen continuirlichen sanft reponierenden Druck auf den Bruch ausübte. STORCH, HEY und BUCHHOLZ breiteten nach der Reposition Heftpflasterstreifen über die Geschwulst hin aus, um die Spaltränder unter einander zu vereinigen; andere wickelten aus demselben Grunde Handtücher oder Binden um den Bauch. COOPER legte über der Öffnung die Haut in Falten und darüber Heftpflasterstreifen; HEY comprimerte ausserdem noch mit einer aus mit Heftpflaster bestrichenen Lederstücken gebildeten Pelotte; ROBINSON mit einer solchen, die eine Porcellanschale darstellte. Aber trotz alledem liess man sich oft genug noch bei der Behandlung der angeborenen Nabelbrüche gehen. OKEN war auch hierin wieder der erste, der gegen diese passive Unthätigkeit eindringlich seine Stimme erhob und durch die, manchen der von ihm angeführten Fälle, beigefügte Kritik die Wahrscheinlichkeit der Erhaltung manches Kindeslebens durch Entschlossenheit zu beweisen suchte. Er selbst reponierte die Darmnetzvorlagerungen, unterband die Geschwulst am Nabelring, schnitt den vor der Ligatur liegenden Teil ab und nähte die Ränder nahe dem Hautüberzug zusammen. HAMILTON wandte bei ähnlichem Verfahren die umschlungene Nat über zwei Silbernadeln an. Wenn auch diese eingreifenden Behandlungsmethoden in einzelnen Fällen zu einem günstigen Resultate führten, so wurden sie doch wegen der leicht nachfolgenden Peritonitis meistens gefürchtet. Jetzt aber, bei der grössten Vervollkommnung der Antiseptik ist diese Furcht unbegründet. Bei nicht reponierbaren Nabelschnurbrüchen ist jedenfalls eine blutige Erweiterung des Nabelringes notwendig, um die mit solchen Brüchen behafteten Kinder am Leben zu erhalten — eine Operation, die schon THUDICHUM als notwendige Bedingung der Heilung solcher Fälle aufgestellt hat.

Nach dieser Auseinandersetzung über die Verbreitung, Ent-

stehung, Beschreibung und Heilung der Nabelschnurbrüche, wie ich noch die Schilderung eines in der hiesigen Gebäranstalt befindlichen Präparates folgen lassen.

Dieses Präparat ist ein Geschenk des Herrn Dr. HEIDENHAIN in Arnsdorf im Riesengebirge. Herr Dr. HEIDENHAIN, dem wir an dieser Stelle unsern verbindlichsten Dank für die Uebersendung des interessanten Präparates aussprechen, schreibt uns folgendes: Das Kind wurde nach 4tägiger Geburtsanstrengung von einer 30jährigen Primipara spontan geboren. Der Kopf lag vor. Die Frucht lebte circa 15 Minuten, d. h. solange schlug das Herz. Athembewegungen wurden nicht wahrgenommen.

Die Frucht, weiblichen Geschlechts, ist gut genährt und besitzt ein stark entwickeltes Fettpolster. Ihr Gewicht beträgt 1650 gr; ihre Länge, von der Nackenfuge bis zum After 17,7 cm; vom Scheitel bis zur Ferse in möglichst gestreckter, aber immer noch in Hüft- und Kniegelenk gebeugter Lage 35 cm.

Der Kopfumfang 33 cm; der gerade Durchmesser des Kopfes, gemessen zwischen *eminent. occip.* und *glabella*, 17 cm; der quere, zwischen beiden *tub. pariet.* 12 cm. Der Kopf selbst besitzt asymmetrische Form; die Kopfgeschwulst befindet sich am Hinterhaupt. Der Hals ist kurz und dick.

Von den Extremitäten, die beide gleich gut entwickelt sind, zeigen die Beine und ebenso die Füße *genu et per varus*-Stellung. Die *vulva* ist ebenfalls normal; Vergrößerung der *nymphae*, wie sie von einigen Autoren beobachtet worden ist, ist nicht vorhanden. Ebensowenig besteht eine *atresia ani*; denn bei leichtem Druck, sowie überhaupt bei jeder passiven Bewegung wird reichlich *meconium* entleert.

Die untere Brust- und obere Bauchgegend ist schmal. Die rechte Brustwarze hat an der normalen Stelle ihren Sitz, während die linke sich bei äusserer Besichtigung nicht auffinden lässt. Die Schulterbreite, in der Höhe der Axelhöhe gemessen, beträgt vorn 7, hinten 8 cm; der Breitendurchmesser des unteren Thoraxraumes 5,3 cm; die Beckenbreite zwischen den beiden *spinac oss. ilei* 5,8 cm; zwischen den Trochanteren 7,2 cm.

Die Wirbelsäule lässt eine starke nach links sehende Skoliose erkennen.

Die wichtigste Abnormität an der ganzen Frucht besteht am Nabelstrang. Aus der oberen und mittleren Bauch- und

Der unteren Brustgegend erhebt sich, mehr nach links gelagert, an einem 12 mm langen Stiele ein blasenförmiges Gebilde von der Grösse des Kopfes des Kindes selbst. Der Stiel sitzt mit seiner 12,3 cm Umfang bildenden Basis der Brust-Bauch-Gegend auf und ist zum Teile mit der Haut des Kindes noch überkleidet, die sich mit einem scharfen Rande gegen die weisse, amnionähnliche Umhüllung des Tumors absetzt. Der grösste Umfang desselben beträgt 26,5 cm.

Die Nabelschnur, mit einer Länge von nur 15,3 cm, zieht sich an der rechten Seite derselben Geschwulst hin und erscheint erst 3 cm von der Oberfläche des *abdomen* der Geschwulst einverleibt. Durch Präparation lassen sich an ihr 2 Gefässe, eine Vene und eine Arterie, erkennen. Die Arterie weist im Verlaufe ihrer Länge mehrere Weizenkorn grosse Ektasieen auf, die mit Blutgerinnsel angefüllt sind. Ein zweites arterielles Gefäss lässt sich nicht nachweisen.

Die *placenta* (Gewicht 200 gr) ist an ihrer convexen Oberfläche gelappt. Sie zeigt hier einen Längsdurchmesser von 15,5 cm; an ihrer concaven Fläche einen solchen von 11 cm. Ihr Querdurchmesser beträgt 13,5 cm und ihr Umfang 34 cm.

Da das Präparat ziemlich eingetrocknet war, so ist auch die Hülle des Nabelschnurbruchs nicht mehr in dem Grade durchsichtig, dass man seinen Inhalt erkennen kann. Gleichwohl lässt sich durch Palpation darauf schliessen, dass die ganze linke Hälfte Darmschlingen, die rechte, resistenter, dagegen die Leber enthalten müsse.

Auf ihrer linken Seite ist die Geschwulst nicht vom Amnion, sondern nur vom Bauchfell überzogen. Hier befindet sich eine Oeffnung von 6 mm, welche, wie es den Anschein hat, nicht als Kunstproduct betrachtet werden darf. An dieser Stelle entleert sich eine gelblich graue flockige Masse, welche wohl, wie bei DITHMAR, aus dem ursprünglich flüssigen und nur infolge der längeren Aufbewahrung in Spiritus zu dieser trüben Masse umgewandelten Inhalte bestehen mag.

Es wird nun die Bauchhöhle durch einen Längsschnitt geöffnet und die beiden Lappen nach rechts und links bei Seite geschlagen, was sich leicht geschehen lässt, da die prolabierten Eingeweide nirgends durch Adhäsionen an der Bauchwandung festgehalten werden. Das *peritoncum parietale* bildet die innere

Auskleidung des Bruches und ist von normaler glatter Beschaffenheit.

Der Inhalt des Bruchsackes liegt nun frei zu Tage (cf. Figur). Zuerst kommt der Herzbeutel zu Gesicht; rechts darunter die abnorm gestaltete Leber. Dieselbe erstreckt sich an der ganzen rechten Seite der Geschwulst nach abwärts hin. Links unter neben ihr liegt eine Anzahl von Dünndarmschlingen, unter denen der *processus vermiformis* hervorsieht. Derselbe hat eine Länge von 1,5 cm und eine Dicke von ungefähr 2—3 mm. Es ist hier also der Uebergang des Dünndarms in den Dickdarm. Daneben links zieht sich frei über die vordere Wand der Geschwulst der 9 cm lang aufsteigende Ast des *colon* hin, der sich in das nur 5 cm lange *colon transversum* und das 8,5 cm lange wieder sichtbare *colon descendens* fortsetzt. Noch weiter links daneben erhebt sich das circa 15—16 cm lange und über Daumendicke breite *S. romanum*, das prall mit *meconium* angefüllt ist. In der oberen linken Ecke der Geschwulst, zwischen Leber und Dickdarm lagert sich der Magen und das mehrfache Windungen bildende *duodenum*.

Zieht man den Magen etwas nach rechts, so erscheint die Milz. Ihr Längsdurchmesser beträgt 3,8 cm; ihr Querdurchmesser 1,3 cm. Links von der Milz kommt die linke Nebenniere zu Gesicht, welche mit ihr durch ein Ligament verbunden ist, und oberhalb der Nebenniere in der Tiefe der linke untere Lungenlappen. Es grenzen also Herz, Lunge und Niere dicht an einander.

Vom convexen Magenrande entspringt das *omentum majus*; es zieht sich mit einem Schenkel zur Milz als *lig. gastrolienale*, mit dem anderen, viel breiteren, zum *duodenum* und dem *colon transversum*. Dasselbe bedeckt kein dünnes Gedärm. Öffnet man die unter dem grossen Netze liegende *bursa omentalis*, so zeigt sich das 2,5 cm in der Länge und 1,8 cm in der grössten Breite messende ovale *foramen Winslowii*, durch das man hinter der Leber unter dem *lig. teres* nach aussen gelangen kann. Durch die beiden das *foramen* begrenzenden Schenkel wird ein kleiner Teil der Leber ungefähr von der Grösse eines Zehnpfennigstückes abgeschnürt.

Zwischen Magenconcavität und Leber spannt sich das *omentum minus* aus, von dem fibröse Fasern noch zum *pericardium* verlaufen.

Das Mesenterium entspringt unterhalb der Niere an der Ausbuchtung der Lendenwirbelsäule und setzt sich an das ganze Gedärm, *duodenum*, *tenue*, *colon* und den grössten Teil des *S. ro-*
manum an. Die Nabelvene verläuft senkrecht aufsteigend auf der rechten Seite der Geschwulst und wendet sich dann im rechten Winkel der Oberfläche der Leber zu, um sich in deren Längsfurche 3,5 cm lang einzusenken und dann in die Leber-Substanz selbst einzudringen.

Das *pericardium* setzt sich an der linken Seite des Brustbeines circa 2 cm weit an und geht in die Hüllen des Brustsackes in der Sagittallinie ungefähr an der Stelle über, wo die normale Haut zur Amnionscheide wird. Das *sternum* besitzt keinen *processus ensiformis*. Jetzt wird das Brustbein hinweggenommen und der Herzbeutel längs der grossen Gefässe aufgeschnitten. Sogleich fällt in die Augen, dass das Zwerchfell vollständig fehlt, man müsste denn die kurze sehnige Fortsetzung des Herzbeckels auf die Enden der unteren Rippen dafür ansehen. Das vordere Mediastinum füllt zum grossen Teil die ungefähr ein Zweimarkstück grosse *glandula thymus* aus.

Das Herz, etwas grösser als ein Einmarkstück, hat ein Gewicht von 10 gr und ist mit seiner Längsaxe von einer Seite zur anderen gelagert. Seine Oberfläche ist, weil das Präparat ziemlich eingetrocknet war, nicht mehr deutlich zu unterscheiden. Indes lässt sich immer noch im ganzen und grossen sagen, dass seine Form sich der eines Kreises nähert, da auch seine Spitze ziemlich abgerundet erscheint.

Ausserdem ist das Herz um seine Axe in der Weise gedreht, dass man, wie im normalen Zustande, den rechten Ventrikel in grösserer Ausdehnung zu sehen bekommt, als den linken. Das rechte Herzhorn hat ziemlich die halbe Grösse des Herzens selbst. Am Klappenapparat ist nichts abnormes zu entdecken, ausgenommen, dass die *arteria pulmonalis* nur 2 *valvulae semilunares* besitzt, eine Abnormität, die öfters im Gefolge von Nabelschnurbrüchen beobachtet wurde. Die grossen Gefässe steigen fast senkrecht in die Höhe. Zu äussersten Rechten ist die obere Hohlvene gelagert, neben ihr nach innen die *aorta*. Dieselbe zieht sich 2 cm aufwärts und bildet den *arcus aortae*, aus dem 2 *arteriae anonymae* entspringen, die sich bald, die linke, nachdem sie 2,5 cm, die rechte, nachdem sie 1 cm neben der *trachea* entlang gelaufen sind, in *carotis* und *subclavia* teilen.

Die *aorta abdominalis* folgt der Biegung der Wirbelsäule. Der *ductus arteriosus Botalli* zwischen Aortenbogen und *arteria pulmonalis* ist in seiner ganzen Länge von 2 cm und in seiner Breite von 4 mm noch vollständig erhalten und für die Sonde gut durchgängig. Die gemeinsame Lungenarterie teilt sich sogleich nach ihrem Ursprunge in die sehr dünnen *arteria pulmonales propriae*, von denen die rechte 2,5 cm, die linke 1,5 cm in der Länge misst. Diese Differenz der Maasse kommt daher, dass die linke Lunge tiefer sitzt, als die rechte, deren Hilus sich ungefähr in der Höhe des Aortenbogens befindet.

Die Teilungsstelle der *trachea* in die beiden Bronchien liegt 5 cm unterhalb des Kehlkopfes. Beide Lungen sind missgestaltet. Die linke Lunge (Gewicht 2 gr) zeigt 4 Lappen, die mehr oder minder wieder mit Einschnitten versehen sind; die rechte (3 gr Gewicht) dagegen besitzt nur 3 Lappen, von denen die beiden unteren miteinander eine kleine haselnussgrosse Ausbuchtung für die rechte Niere bilden helfen.

Die Leber, *in toto* herausgenommen, zeigt in ihrer convexen Oberfläche eine tiefe Furche zur Aufnahme des *ligamentum teres* mit der *vena umbilicalis*. Wegen der tiefen Lage der Leber ist der abdominale Teil der Vene sehr kurz. Diese Furche setzt sich auch auf die Unterfläche bis zum *hilus* fort. Die Gallenblase fehlt gänzlich. Gallenblasen-Defect wurde ausserdem noch bei Nabelschnurbrüchen von SCHÄFFER und OTTO, Atrophie derselben von SCHULTZE beobachtet. Die Leber wird also durch diese Furche in 2 Lappen, in einen kleineren oberen und einen grösseren unteren, geteilt. Vom *hilus* aus zieht sich noch eine seichte kurze Furche auf dem kleineren Lappen hin, die von demselben ein keilförmiges Stück abtrennt. Vor dem *hilus* liegt der *lobus Spigelii*, der, wie schon erwähnt, durch das *foramen Winslovii* in 2 Lappchen getrennt wird, welche durch eine schmale Brücke miteinander zusammenhängen. Das Gewicht der Leber beträgt 117 gr; ihr Längsdurchmesser circa 9,5 cm; ihr Breitendurchmesser ungefähr 7 cm.

Der *oesophagus* hat die bedeutende Länge von 11,5 cm. Der *duodenum* und Dünndarm betragen zusammen 115 cm; *colon* und *rectum* 40 cm. Der Magen hat eine Länge von 5,5 cm.

An der Wirbelsäule springt, wie schon gesagt, eine sehr bedeutende Skoliose in die Augen. Ihre Convexität sieht nach links, in der Gegend der letzten Brust- und ersten Lendenwirbel.

Von der Wirbelsäule entspringen auf beiden Seiten je 11 Rippen, von denen sich rechts 8, links 6 mit dem Sternum verbinden.

Die Untersuchung der Harnorgane zeigt keine Defecte. Von den Nieren, die deutlich extraperitoneal gelagert sind, ist die rechte mehrfach gelappt, während die linke entsprechend ihrer Lage eingekeilt zwischen Wirbelsäulenausbuchtung und Ursprung der linken Rippen, eine längliche Form angenommen hat. Die Nebennieren haben eine ganz abweichende Lage zu einander und zu den Nieren. Aus dem *hilus renum* entspringt je ein *urether*, die beide in die hypertrophierte und sehr verdickte Blase münden. Die *urethra* ist durchgängig. An den Genitalien zeigt sich ein Defect der Tuben und Ovarien. Die Scheide ist 3 cm lang, der uterus misst vom *orificium externum* bis zur Spitze ebenfalls 3 cm. Er besitzt eine lange, schlauchförmige Form, an der sich *cervix* und *fundus* nicht unterscheiden lassen. Durch diesen unsren Fall erhält also die Behauptung von LINDFOERS eine Stütze, dass in der grössten Anzahl der sonstigen Missbildungen bei Nabelschnurbrüchen Anomalien der Genitalien vorhanden sind.

VERZEICHNISS DER LITTERATUR UEBER NABELSCHNURBRUCH.

Die mit * bezeichneten Werke habe ich selbst benützt;

T (THUDICHUM) *K.* (KRAEMER) *V. H.* (VIRCHOW --- HIRSCH Jahresberichte)
O. (OKEN) *A.* (AHLFELD) *H.* (HEHRHOLDT) bezeichnen die Namen der Autoren,
welche den Titel der vorstehenden Werke aufgeführt haben.

*AHLFELD Fr. die Missbildungen des Menschen. 1882. II. Abschnitt p. 196 u. f.

*AHLFELD im Archiv für Gynäkologie. Bd. V. 1873. p. 230.

ALBINUS annotat-academ. lib. I ep. XVI p. 98. *O.*

BAL à FIEL bei Gerson u. Julius, Magazin der ausländischen Litteratur der
ges. Heilkunde. Hamburg 1830. Bd. 19. p. 135 und in Vaterlän-
dische Letteroefeningen. 1826. p. 456. *K.*

BÉRARD dictionn. de med. 22. • p. 32.

BERTHELOT in lancette française, gaz. des hôpitaux. 1832. 14 Janv. Nr.
100. tome V, als Auszug in Froriep's Notizen. Bd. 32. Nr. 22.
Febr. 1833.

BLANCARDUS de morbis infant. pars III. obs. 11. *K.*

BONN Verhandl. van het Genootsch ter Bevord der Heelkunde te Amaster-
dam 1791. Deel I. p. 183. *O.*

BORGES W. H. L. in seiner Übersetzung von Sabatier's Lehrbuch für prakt.
Wundärzte. Berlin 1791. Th. I. p. 123. *T.*

*BRUNATTI Jahresbericht über die königliche Entbindungsanstalt zu Danzig
v. J. 1828 in v. Siebold's Journal für Geburtshülfe. 1830. Bd. IX.
Stück 3. p. 574.

BUDENS über Nabelschnurbruch. diss. inaug. Marburg. 1862.

BUCHHOLZ Fr. II. diss. de hepatomphalocoe congen. Argent. 1786. *T.*

CAMERARIUS et MAUCHARD, diss. med. chir. de hernia connata nova encheires.
extricata. Tubing. 1722 in Halleri coll. chir. tom. III. 1755. p. 83.

*CEDERSCHJELD in Ärs-Berättelse om Svenska Läkare Sällskapets Arbeten.
Auszug in Schmidt's Jahrbücher, 1839. Bd. XXIV.

*CARUS in v. Siebold's Journal für Geburtshülfe. 1831. Bd. X. p. 81.

CHELIUS Chirurgie. Bd. I. Abt. 2. p. 281. *K.*

CONRADI J. G. Selecta medica francofurt. Anatonien illustrant. T. II. Vol.
III. Francofurti ad Viadr. 1741. p. 69. *O.*

COOPER A. Anatomy and surgical treatment of crural and umbilical hernia.
Lond. 1807. p. 50. Bd. II. *K.*

*CRUVEILLIER J. traité d'anatomie patholog. générale. Paris 1849. tom. 1.
p. 624.

*CRUVEILLIER anatomie patholog. livr. 31. pl. 5. Paris 1830—1842.

*CRUVEILLIER 2 Fälle von angeb. Nabelbrüche. Bericht in Schmidt's Jahr-
bücher 1839. p. 223.

- EBOUT bullet. de l'academie de méd. de Belg. 1858. 2. ser. I, 4.
- ETHMAR über einen Fall von abgeschnürtem Nabelbruch, diss. inaug. Marburg. 1875.
- FOERING M. de medic. pract. 1611. p. 97. O.
- FRANCAUERS in annal. Phys. med. Vratisl, anno 1729, mens. Aug. art. VII. p. 515.
- FRUYTREN trait. compl. d'anatom. chirurg. tom. II. Paris 1837. p. 21. O.
- FABER G. Fr. duorum monstr. hum. deser. anat. diss. inaug. Berol. 1827.
- FRANKENREICH F. Zur operativen Behandlung der hernia funiculari umbilicalis in Wiener med. Presse. 1883. Nr. 17. p. 532. VH.
- FRIEDL diss. de foetu intest. plane nudis extra abdom. propendent nato im 1. Bande des Sandifort'schen thesaurus dissert. K.
- FRÖSSNER in Breslauer Sammlung von Natur und Medizin. 1724. Winterquartal. p. 420. art. 9.
- FRÖCKEL E. in miscell. nat. curios. dec. II. ann. VI. p. 263. obs. 126. O.
- FRÖDLER irreducible hernia into the base of the umbilical cord. med. Times. 1883. 9 june. VH.
- FRÖGRAND annal. de la chirurg. Janv. 1844.
- FRÖSSEROW in Monatschrift für Geburtskunde. Bd. XXI. p. 1.
- FRÖGER M. die Brüche und die Vorfälle. Wien 1834. K.
- FRÖLL Archibald. transact. of the obstetrical society of London. Vol. IX. p. 271. 1868.
- FRÖLLER commerc. litt. Norimbg. 1756. Hebd. 10. p. 78. T.
- FRÖLLER opusc. patholog. oper. min. anat. argum. tom. III. p. 315. obs. 35. ex. prog. ad disp. Vaterli Götting. 1753. O.
- FRÖMELT bei A. COOPER. l. c. p. 54. siehe das.
- FRÖCKER C. Klinik der Geburtskunde. Bd. II. 1864. sub: hernia umbilic. p. 231.
- FRÖNKE Handbuch der Erkenntnis und Heilung der Kinderkrankheiten. p. 173. Frankfurt 1821.
- FRÖNNIG Sitzung der Gesellschaft für Geburtshülfe. Leipzig. 15. Nov. 1880. A.
- FRÖHRHOLDT J. D. Beschreib. sechs menschl. Missgeburten. Kopenhagen 1830. V. p. 59.
- FRÖHOLD Ch. in Starkes Archiv für Geburtshülfe etc. Jena 1791. Bd. III. Stück 1 p. 82.
- FRÖSELBACH die Lehre von den Eingeweidebrüchen. Würzburg 1830 p. 39 K.
- FRÖY practical observations in surgery. London 1803. p. 227. Deutsch als Chirurgische Beobachtungen. Weimar 1823. p. 177. K.
- FRÖCHSTETTER Th. in rar. obs. medicinal. dec. VI. cas. V. p. 699. ann. 1674. O.
- FRÖRCH in miscell. nat. curios. Dec. III. Ann. III obs. 97 p. 189. O.
- FRÖHNERWOLF in transact. of the obst. society. Lond. Vol. XII. p. 248. 1871. A.
- FRÖRNIBLOW J. A. in misc. nat. curios. Dec. II. Ann. IX. 1691. p. 170. obs 98 fig. 25. T.
- FRÖKTSCHMIDT Programm zu Hufeland diss. de embryon. hernioso. 1767. H.
- *FRÖKRAMER Heilung eines angeb. Nabelbruches. Zeitschrift f. ration. Med. n. F. 1853. Bd. III. p. 218.

- LACHMUND in misc. nat. curios. Dec. I. Ann. III. 1673. 166. obs. 103.
- LEHMANN im Schauplatz der natürl. Merkwürdigkeiten in den Meissnisch. Ober-Erzgebirgen. p. 750.
- LINDFÖRS fall of Nafvelsträng bräk. hälsa. p. 1. 1882. *VH*.
- LINDFÖRS om Nafvelsträngs bräck. Nord. med. Arkiv. Bd. XV. 1883. *V*.
- LUECKE de monstro quodam humano. diss. inaug. Halle 1854. *A*.
- MALGAIGNE anat. chirurg. übers. von Reiss und Lehmann. Prag 1841. Bd. I p. 39. *K*.
- MARGARITEAU bulletin de therap. 1855. Juin.
- MARRIQUES recueil. périod. tome. II. p. 31,
- MAURICEAU observ. sur la grossesse et l'accouchement 1611. p. 371 und p. 97. *O*.
- *MECKEL Handbuch der patholog. Anatomie. Leipzig 1812. Bd. I. p. 138.
- MERY observ. sur les hernies in memoir. de l'acad. des sciences de Paris 1716. p. 271. *K*.
- MERY in histoire de l'academie royale des sciences. Année 1716. Amsterdam. 1719. p. 178. *T*.
- MOOR in Schweizer Zeitschrift für Heilkunde. Bd. II. p. 256. 1863. *A*.
- *MÜLLER J. B. in Rust's Archiv für die ges. Heilkunde. 1823. Bd. XV Nr. 62.
- *MÜLLER über den Nabelschnurbruch. diss. inaug. Erlangen 1841.
- OEHME diss. de morb. infant. chirurgicis. p. 38. *K*.
- *OTTO A. W. monstror. sexcent. descript. anat. Vratisl. 1841.
- *OKEN Preisschrift über Entstehung und Heilung der Nabelbrüche. Landshut 1810.
- ORLIAC des hernies umbilicales congenitales. thèse. Paris 1877. *VH*.
- OSTERLOH in Winkels Berichte und Studien aus der Entbindungsanstalt in Dresden. 1874. p. 215. *A*.
- POCHHAMMER in Casper's Wochenschrift. 1846. Nr. 9.
- POTTHOFF descr. casus rariss. spinam bifidam totalem sistens. diss. inaug. Berol. 1827. *A*.
- REISEL in miscell. nat. curios. anno VIII. 1688. p. 11. obs. 6. *O*.
- REQUIN D. in gazette médic. 1832. 4 oct. *K*.
- *RIEKE in Rust's Magazin für die ges. Heilkunde. Bd. VIII. 1820. p. 130. Heft 1.
- ROBERTS transact. of the obstetr. society of London. Vol. IX. 1869. p. 272. *A*.
- ROBINSON Luke in Baltimore medicinal and surgical Journal and Review. 1834. Auszug in Froriep's Notizen. Bd. 44. Nr. 2. März 1835. *T*.
- ROBINSON C. W. congenital umbilical hernia. Lancet. 22. 1883. *VH*.
- ROCQUES v. über einen menschlichen Acardiacus mit Nabelschnurbruch. diss. inaug. Marburg. 1864. *A*.
- *ROEDERER de foetu perfectu obs. IV in opuscul. medic. collect. Götting. 1763. p. 101.
- RIZZOLI F. vasto sventramento congenito onfalo epigastrico in un neonato. Bologna 1877. *VH*.
- RUYSCH obs. anat. chirurg. centur. Amstelod. 1721 in oper. omn. p. 66 obs. 71. *O*.

- ABATIER médecine opératoire edit. de Bégin et Sanson. tom. II p. 605
deren Uebersetzung von Borges. Bd. I. p. 123. *T.*
- SACHTLEBEN Dietr. W. merkwürdige Beobachtung eines angeb. Eingeweide-
bruches etc. in J. C. Starkes Archiv. Bd. IV. Stück 5. Jena 1793
IX. p. 646.
- SCHÄFFER J. G. nova acta natur. curios. tom IIJ. 1767. p. 1, ob. 1. *T.*
- SCHÄFFER im Journal für Geburtshilfe von Siebold. 1814. Bd. I. Stück II.
u. XI. p. 215.
- SCHULZE act. phys. med. Acad. caes. nat. cur. Vol. I. 1727. obs. 226.
p. 502.
- SANDIFORT observation. anat. pathol. lib. III. *O.*
- SARPE A. über den Nabelschnurbruch. diss. inaug. Halle 1868.
- SCARPA Abhandlungen über die Brüche.
- SCHNEIDER allgem. medicin. Annalen. Altenbg. 1819. p. 655. Mai. *T.*
- *SEILER in Rust's Handbuch der Chirurgie. Bd. VIII. p. 654.
- SENNERT de febris. lib. IV. c. 4 in medic. pract. 1632. *O.*
- SIMPSON de la péritonite chez le foetus comme cause des hernies etc. aus
archiv général de médec. tome VI. 1839. p. 24.
- SOLINGEN C. besondere Anmerkungen de Vrouwen en Kindern betreffende
v. CS. l'Amsterdam 1698. bl. 448. Aanm. 111. *O.*
- *SÖMMERING Preisschrift für die Ursache, Erkenntnis und Behandlung der
Nabelbrüche. Frankfurt a. M. 1811.
- STANLEY in Med. Times. 1852. Juli.
- STORCH therapeut. und pract. Abhandlungen von Kinderkrankheiten.
Eisenach 1751. Teil IV. p. 35. *O.*
- THÉLU hernies ombilic. im journal de chirurg. 1844. Paris. p. 187.
- *THÖRNER 13 Fälle von Nabelschnurbruch. diss. inaug. Marburg 1873.
- *THUDICHUM über den Nabelschnurbruch in *O.* Illust. med. Zeitung von
Rubner. 1852 II. p. 197.
- TREW in commerc. litter. Norimbg. anno 1735. hebdom. XII. p. 1. *O.*
- TYLER W. Bradly. the American Medicinal Recorder of original and
intelligence in Medicine and Surgery. Philadelphia 1821. Vol. IV.
- VELPEAU in trait. compl. d'anat. chirurg. Tome II. Paris 1837. p. 21.
- VIDAL de Cassis des hernies ombilic. et epipl. thèse. Paris 1848. p. 14. *K.*
- WIED SAM. de Abhandlungen der Seeländischen Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Vliessingen, Teil I. Abschnitt I. übersetzt von Andr.
Böhm.
- WILL P. Staalpart van der, observ. rarior. med. anat. chir. cent. II. p. I
Leidae 1727. p. 364. obs. 33. *O.*
- ZWINGER J. D. acta phys. med. acad. caes. nat. curios. Vol. I. 1727
p. 159. obs. 84. tab. 5 fig 5. *O.*

ÜBERSICHT UND ZUSAMMENSTELLUNG DER FÄLLE, WELCHE ICH IN DER LITTERATUR VERZEICHNET GEFUNDEN HABE.

No.	Aut.	Jahr der Beobachtung	Geschlecht	Tod oder Heilg.	Grösse des Bruches	Insertion der Nabelschnur	Verlauf der Vene	Verlauf der Arterie	Maasse des Bruches resp. der Bruchpforte	Inhalt des Bruches	Sonstige Missbildungen.
1	Doering	1610	♀								
2	Mauriceau	1611	♂	†	Faust Hühnerrei						
3	Mauriceau	1673		†							
4	Lachmund	1673							Pforte sehr eng.	Gedärme, Leber, Magen, Milz. Dünndarm, Gekrös Dünndarm	
5	Höchstetter	1674								Gedärme, Leber, Magen, Milz.	
6	Pur	1680	♂		Faust Nuss					Gedärme, Leber, Magen, Milz.	
7	Wiel	1682		†						Gedärme, Leber, Magen, Milz. Dünndarm, Dickdarm.	
8	Reisel	1686	♂	†	Apfel	mitten				Gedärme, Leber, Magen, Milz.	
9	Hühnerwolf	1690	♀	†	Kindskopf						
10	Mery	1715	♀	†		mitten					
11	Mery	1715		†					9—10" Darm. Pforte 15"	Gedärme, Leber, Magen, Milz, Netz.	
12	Gessner	1720	♂	†						Gedärme, Leber, Magen, Milz, Netz.	atresia ani. Defectus genitalium
13	Ruysch	1721		†						Leber.	
14	Zwinger	1727		†	Nuss					Gedärme, Magen, Milz.	
15	Schulze	1727	♀	†	Faust				eng	Dünndarm. deform.	
16	Trew	1735	♂		Faust	unten				Leber. Gedärme.	
17	Haller	1736			Faust					Gedärme, Leber Magen, Milz.	
18	Conradi	1741	♂	†	Apfel	mitten			Gulden-Grösse	ileum.	
19	Schäffer	1748	♀	†	Grosche						

25 26	Herold Sachtleben	1790 1792	♂ ♀	Heilg. †	gr. Kaffetass. K albsblase	unten unten	Vene un- er- heblieh klein	eine Arterie	Groschen-Grösse	Gedärme, Leber, Herz. Gedärme, Leber, Magen, Milz, Netz, Gekröse.
27 28	Borges Schäffer	1797 1811	♀ ♂	† †	Faust kl. Mannsfaust	unten			6" Umfang	mittl. u. unterer Leber- lappen. ohne Gallenblase.
29 30 31 32	Rihke Schneider Tyler Müller	1817 1818 1820 1823	♂ Heilg. Heilg. ♂	Heilg. Heilg. Heilg. Heilg.	ziemlich stark Mannsfaust Mannsfaust	oben links mitten		2" Durchmesser Thaler-Grösse 3" Durchmesser 4" grösst. Durch. 3" Basis-Durch.		
33	Bal	1826	♀	Heilg.		unt. rechts			8 $\frac{1}{2}$ " lang 7" breit	Grösste Theil d. Gedärme.
34	Faber	1827	♂	†		unten		eine Arterie	2" lang 3" grösster Umfg.	tenue, crassum, coecum, colon. colon.
35	Siebold	1827	♂	†	auffallende Dicke der Nabelschnur					
36 37	Hehrhold Brunatti	1828 1828	♀ ♂	† †		mitt u			3" Durchmesser. 8" Umfang 21" Höhe 10" Umfang 31 $\frac{1}{2}$ " Höhe	foramen ovale offen
38	Berthelot	1831	♂	†	colossal	rechts				
39 40 41	Carus Requin Robinson	1831 1832 1834	♂ ♂ ♂	Heilg. Heilg. Heilg.	Faust bis ans Knie	unt. links				Gedärme, Leber, Magen, Milz. Leber, tenue, colon. Grosse Masse der Gedärme.


No.	Aut.	Jahr der Beobachtungen	Geschlecht	Tod oder Heilg.	Grösse des Bruches.	Insertion der Nabelschnur.	Verlauf der Vene	Verlauf der Arterie	Maasse des Bruches resp. der Bruchpforte	Inhalt des Bruches	Sonstige Missbildungen.
42	Cederschjöld	1839	♀	†	Faust beträchtlich	mitten unt. links			1" Durchmesser.	Grösster Teil d. Gedärme rechter Leberlappen.	
43	(ruveillner	1839	♂	†							
44	Otto-495	1841	♂	†		unten	Vene links	eine Arterie,		Grosse Leber, Milz, Magen, Dünndarm.	lab. lepotin-Missbildung der Oberextremitäten. keine Gallenblase defect. org. urinif. et genit. Fehlen d. proc. xiph. Theilweis. Fehlen der Wirbelsäule.
45	Otto-514	1841	♂	†							
46	Otto-515	1841	♂	†	Orange		Vene oben	eine Arterie links		Magen, rundliche Leber	sept. atrior offen, art. pulm. zwei Klappen.
47	Otto-516	1841	♀	†	Mannsf Faust					Leber, grösster Theil des Dünndarms.	
48	Otto-517	1841	♀	†	sehr gross	unten	Vene rechts	eine Arterie links		Leber Gedärme	uterus bicorn. art. pulm. zwei Klappen.
49	Otto-518	1841	♂		Kindskopf	unten				die meisten Eingeweide.	
50	Otto-519	1841	♂		fast Kindskopf		Vene links Vene rechts			fast alle Eingeweide.	
51	Otto-520	1841	♂	†		unten				Leberlappen, Dünndarmschlingen.	art. pulm. zwei Klappen.
52	Otto-521	1841	♂	†	Orange	unten		eine Arterie links			

56	Otto-523	1841	♀	†	Mannsfaust	unten	Vene links					vagina, uterus duplex.
57	Otto-526	1841	♂	†		placenta, unmittelb. a. Bruchsk.						fissura ventris, pelvis et genital. Defect. genit.
58	Otto-527	1841										
59	Müller	1841										
60	Thélu	1844	♀	Heilg.								
61	Neugebauer	1841	♀	†	kleine Faust	unt. rechts					Leber.	
62	Stanley	1850									Lange Darmschlinge	
63	Krämer	1851	♀	Heilg.	Mannsfaust	unt. links					Gedärme, abnorme Leber.	spina bifida, foramen ovale offen.
64	Thudichum	1851	♂	Heilg.	halber Apfel	mitten					Leber, Gedärme.	
65	Margariteau	1855	♂	Heilg.	Hühnerei	mitten					Darmschlingen Leber, Herz.	fehlt proc. ensif.
66	Hecker	1862		†								
67	Sarpe	1867	♀	†		unten					halb kugelige Leber, Stück Leber, $\frac{2}{3}$ Dün- darm.	
68	Sarpe	1867	♀	†		unten						
69	Thörner	1873	♀	†	kegelförmig	mitten	Vene oben	Arterie unten			nur Leber	Nabelschnur 5 cm.
70	Thörner	1873	♂	†							vergröss. Leber, Magen, Milz, ganzer Darm.	Fehlen d. linken Beines.

No.	Auton	Jahr der Beobachtungen	Geschlecht	Tod oder Heilg.	Grösse des Bruches.	Insertion der Nabelschnur.	Verlauf der Vene	Verlauf der Arterie.	Masse des Bruches resp. der Bruchpforte	Inhalt des Bruches	Sonstige Missbildungen.
71	Thörner	1873	♀	†			Vene rechts oben	eine Arterie oben	6 cm. Höhe 17 cm. Bas.-Umf.	Leber, Magen, Milz, linke Niere-Darm,	Scoliose nach rechts defect. genital.
72	Thörner	1873	♀	†	halbkuglig	unten	Vene oben	Arterie unten	3,5 cm. Höhe	Leber,	
73	Thörner	1873	♂	†		mitten	Vene abwärts.	Arterie abwärts.	16 cm. Bas.-Umf. 6,5 cm. Höhe 16 cm. gr.-Umf. 9 cm. Bas.-Umf.	Leber, Dünndarm.	4 Finger an jeder Hand
74	Thörner	1873	♀	†		unt. links	Vene oben	Arterie unten	12,5 cm. Höhe 29 cm. Bas.-Umf. 15 cm. Bas.-Dreh.	stark vergrösserte Leber, Milz, Darm,	
75	Thörner	1873	♂	†	Hühnerei	unt. links			1 cm. Bas.-Durch. 5 cm. Höhe 28 cm. gr. Umf. 17,5 Bas.-Umf.	Dünndarm Leber, Magen, Milz, Nieren, Darm, Uterus Dünndarm	lab. leporinum defect. genital. Nabelschnur 3 cm. Darm mündet i. Harnbl. Hirnbruch und andere Defecte
76	Thörner	1873	♀	†					3 cm. Höhe 8 cm. gr. Umf. 5 1/2 cm. Bas.-Uf. 7 cm. Höhe 23 grösst. Umfg. 12 Basis-Umf.	ganzer Darm, Leber, Magen, Milz, Nieren	lab. leporin.
77	Thörner	1873	♀	†	kuglig	unten			6 1/2 cm. Höhe 22 grösst. Umfg. 14,5 Basis-Umf.	vergrösserte Leber.	
78	Thörner	1873	♂	†	kuglig	unten			5,5 cm. Höhe 27,5 grösst. Umf. 23 Basis-Umf.	Leber, Darm, Milz, lob. Spigelli sehr vergröss.	defect. genital. ext defect. dia-
79	Thörner	1873	♂	†		unten					phragm
80	Thörner	1873	♀	†							
81	Thörner	1873	♀	†	kuglig						







LEBENS LAUF.

Verfasser, GEORG BUSCHAN, Sohn des Kaufmanns THEODOR BUSCHAN zu Frankfurt a. O., wurde daselbst am 14. April 1863 geboren. Er besuchte anfangs die Vorschulklassen des Königl. Friedrichsgymnasiums zu Frankfurt a/O., dann nach dem Tode seiner Eltern, die ihm im Jahre 1871 durch die Cholera entzissen wurden, die Knabenschule zu Sommerfeld, das Königl. Gymnasium zu Schneidemühl und wiederum das Friedrichsgymnasium zu Frankfurt a/O., welches er Michaelis 1882 mit dem Zeugniß der Reife verliess. Er widmete sich auf der Universität, und zwar zuerst in Breslau, dem Studium der Medicin und Naturwissenschaften. Während seines ersten Studienjahres beteiligte er sich an der von der philosophischen Fakultät erstellten botanischen Preisarbeit und hatte das Glück am Geburtstage Sr. Majestät im Jahre 1884 mit dem ausgesetzten Preise elohnt zu werden.

Das *tentamen physicum* bestand er im Februar 1885; einer halbjährigen Militärpflicht unter der Waffe genügte er im Winterhalbjahre als Einjährig-Freiwilliger bei der 6. Batterie schles. Feld-Artillerie-Regiments Nr. 6. Ostern 1886 begab er sich nach der Universität München, woselbst er noch weilt.

Das *examen rigorosum* absolvierte er am 6. Dezember 1886 in Breslau.

Während seiner bisherigen Studienzeit besuchte er die Vorlesungen, Curse und Kliniken folgender Herren Professoren und Dozenten:

in Breslau: BIERMER, BORN, F. COHN, H. COHN, FISCHER, FRITSCH, GIERKE (†), HASSE, HAESER (†), HEIDENHAIN, HIRT, JOSEPH, KOERBER (†), LOEWIG, MEYER, PARTSCH, POLECK, PONFICK, RICHTER, ROEHMANN, ROUX, SCHNEIDER.

in München: AMANN, ANGERER, BAUER, BOLLINGER, v. HOESSLIN, RITTER v. NUSSBAUM, PASSET, POSSELT, v. ROTHMUND, SCHECH, STINZING, v. VOIT, WINKEL, v. ZIEMSSSEN.

THESEN.

1. Der Nabelschnurbruch ist eine Hemmungsbildung.
2. Antipyrin ist ein antifebriles Mittel ersten Ranges.
3. Zur Verminderung des Verbrechens der Kindesabtreibung ist der Vorschlag von VERT berechtigt: den § 218 des Strafgesetzbuches vom 15. Mai 1871 in der Weise abzuändern, dass „eine Schwangere, welche sich ihre Frucht vorsätzlich abtreiben lässt, straflos ausgehen soll“ und als Äquivalent für diese Straffreiheit zu dem § 300 hinzuzufügen, „dass in allen derartigen Fällen den Ärzten die Pflicht der Anzeige auferlegt werde.“